

Debrecen

2018.09.29.

Budapest

2018.10.27.



Szeged
2018.10.06.



Győr
2018.10.27.



Elcsavargott igazság

Bizonyítékon alapuló orvoslás és közösségi média

KRKA akkreditált továbbképző tanfolyamok családorvosok és szakorvosok részére

Debrecen, Kólcsey Központ | **2018. szeptember 29.**

Szeged, Novotel Szeged | **2018. október 6.**

Budapest, Raddison Blu Béke | **2018. október 27.**

Győr, Famulus Hotel | **2018. október 27.**

Amikor többre van szükség¹

ÚJ!

 **Ezoleta**[®]
10 mg, tabletta ezetimib

Ezoleta 10 mg tabletta, 10 mg ezetimib tartalmaz tablettánként. **Javallatok:** Primaer hypercholesterinaemia. Az Ezoleta HMG-CoA-reduktáz-gátlóval (sztatinnal) együtt, diéta mellett adva, primaer (heterozygota familiaris és nem-familiaris) hypercholesterinaemiában szenvedő betegek adjuváns kezelésére javallott, amennyiben az önmagában adott sztatín hatása nem elégséges. Az Ezoleta önmagában, diéta mellett adva, primaer (heterozygota familiaris és nem-familiaris) hypercholesterinaemiában szenvedő betegek adjuváns kezelésére javallott, akiknél a sztatín adása nem megfelelő, vagy nem tolerált. Cardiovascularis események megelőzése. Az Ezoleta a coronaria-betegségben szenvedő és akut coronaria szindróma kórtörténettel rendelkező betegeknek, sztatín-kezelés mellett vagy sztatinnal történő egyidejű alkalmazás megkezdésekor a cardiovascularis események kockázatának csökkentésére javallott. Homozygota familiaris hypercholesterinaemia (HoFH). Az Ezoleta sztatinnal együtt, diéta mellett adva HoFH-ban szenvedő betegek adjuváns kezelésére javallott. A betegek egyéb adjuváns kezelést is kaphatnak (pl. LDL-aferezis). **Adagolás:** A kezelést megelőzően a beteg standard, alacsony koleszterintartalmú diétára kell beállítani, amit a kezelés alatt is folytatni kell. A javasolt dózis napi egy 10 mg-os tabletta, amit bármely napszakban, étkezés közben vagy attól függetlenül is be lehet venni. Az Ezoleta valamely sztatinnal való hozzáadásakor vagy az alkalmazott sztatín javasolt szokásos kezdő dózisa, vagy a már bevált magasabb sztatín dózis alkalmazását kell folytatni. Ebben az esetben az adott sztatín adagolására vonatkozó javaslatot kell követni. Coronaria-betegségben szenvedő és akut coronaria szindróma kórtörténettel rendelkező betegeknek az inkrementális cardiovascularis esemény csökkentésére 10 mg ezetimib adható sztatinnal, bizonyítottan kedvező cardiovascularis hatással. Az Ezoleta az epesavkötő szerek bevétele előtt legalább 2 órával korábban, vagy azok bevétele után legalább 4 órával később adandó. **Időselek:** Idős betegek esetében nem szükséges a dózist módosítani. Gyermekek és serdülők: A kezelést kizárólag szakember felügyelete alatt lehet elkezdni. 6 év feletti gyermekek és serdülők: az ezetimib biztonságosságát és hatásosságát 6-17 éves gyermekek és serdülők esetében nem igazolták. Az Ezoleta sztatinnal történő együttes alkalmazásakor a sztatín dózissal kapcsolatban szakvéleményt kell kérni gyermekek esetében. 6 évesnél fiatalabb gyermekek: az ezetimib biztonságosságát és hatásosságát 6 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok. **Májkárosodás:** Enyhe

májkárosodásban (Child-Pugh osztályozás szerinti pontszám: 5-6) a dózist nem szükséges módosítani. Az Ezoleta-kezelés nem javasolt közepesen súlyos (Child-Pugh osztályozás szerinti pontszám: 7-9), illetve súlyos (Child-Pugh osztályozás szerinti pontszám: >9) májfunkció zavar esetén. **Veseelégtelenségben** nem szükséges a dózist módosítani. **Ellenjav:** készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Az Ezoleta és valamely sztatín együttadása ellenjavallt terhességben és szoptatás alatt. Az Ezoleta és valamely sztatín együttadása ellenjavallt olyan betegeknek, akiknél aktív májbetegség vagy tisztázatlan eredetű, tartós szérum transzaminázszint-emelkedés áll fenn. **Mellékhatások (gyakori):** hasi fájdalom; hasmenés; flatulencia; fáradtság. **További gyakori mellékhatások az ezetimib valamely sztatinnal együtt történő alkalmazásakor:** megnövekedett ALAT- és/vagy ASAT-értékek, fejfájás, myalgia, ill. fenofibráttal: hasi fájdalom. **Megjegyzés:** * (egy keresztes). Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). Forg. eng. jog.: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia. **Szöveg ellenőrzés dátuma:** 2017. január 11.

Készítmény megnevezése	Bruttó fogyasztói ár (Ft)	Emelt támogatási összeg (Ft)	Térítési díj emelt támogatás esetén (Ft)	Közzégyonkiváltható-e
Ezoleta 10 mg tabletta 30x	5 035	4 532	503	✓

Az árak 2018. augusztus 1-jétől érvényesek. A mindenkori árakról bővebb információt a NEAK honlapján – <http://neak.gov.hu/> – találhat.

A tájékoztató kizárólag gyógyszerek rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára készült.

A hatályos alkalmazási előírásokat a <https://www.ogyel.gov.hu/gyogyszeradatbazis/> webcímen tudja elérni. Az adott gyógyszer alkalmazási előírását a „Gyógyszer nevének” rész kitöltésével és „Keresés indítása” parancssal tudja elindítani. A keresés eredményénél a  ikonra kattintva tudja elérni az adott alkalmazási előírást.

Irodalom:

1. Ezoleta alkalmazási előírás <https://www.ogyel.gov.hu/nyitoldal/> 2. http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeskoz_gyogyfurd_tamogatasi/Szakembereknek/Tajekoztato.html



Fejlesztés és tudás a kiváló minőségű, hatásos és biztonságos termékekért.

Tisztelt Kolléga!

A Krka Magyarország Kft. évek óta kiszámítható együttműködő partnere az egészségügy szereplőinek, és a jövőben is aktívan szeretnénk hozzájárulni a háziorvosok, szakorvosok magas szintű szakmai képzéséhez.

2018-ra tervezett programunk kialakítása során arra törekedtünk, hogy az egyes szakterületek kiváló szakembereit nyerjük meg előadónak, és olyan témákat tűzzünk napirendre, amelyek az Önök gyakorlati munkájához nyújtanak segítséget. Hisszük, hogy az ismeretek bővítése, az orvosi munka során szükséges gondolkodásmód kiterjesztése hozzájárulhat az eredményes gyógyító munkához.

Ezt kívánjuk elősegíteni továbbképzéseinkkel, akkreditált tanfolyamainkkal, valamint kiváló minőségű, megbízható termékeinkkel.

dr. Valiskó Gyöngyi
marketing menedzser

Tervezett program

Debrecen | 2018. szeptember 29.

Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadók személyében történő változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen az első 100 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

Helyszín: Debrecen, Kőlcsey Központ

4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.,

www.kolcseykozpont.hu

Üléselnökök:

Prof. Dr. Csanádi Zoltán, egyetemi tanár, az MTA Doktora
DE KK Kardiológiai Intézet

Prof. Dr. Páll Dénes, egyetemi tanár, az MTA Doktora
DE KK Belgyógyászati Intézet



09.00–09.30 **PPI kezelés hosszútávon**

Prof. Dr. Altorjay István, egyetemi tanár, az MTA Doktora
DE KK Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék

09.30–10.00 **Még, még, még, ennyi nem elég: koleszterincsökkentés a lipidológus szemszögéből (Statin+Ezetimibe vagy Községi média? Mivel érem el a célértéket?)**

Dr. Harangi Mariann, egyetemi docens
DE KK Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere-betegségek Tanszék

10.00–10.30 **Biztos kombinációk-biztos siker!**

Dr. Fülöp Tibor, egyetemi adjunktus
DE KK Kardiológiai Intézet, Kardiológia

10.30–11.00 **Szünet**

11.00–11.30 **Evidenciák vagy Herbária? Válasszuk a biztosat!**

Dr. Bakk Judit, kórházi adjunktus
Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Fül- Orr- Gégészet és Fej- Nyaksebészeti Osztály

11.30–12.00 **Interdiszciplináris pánik? Avagy különböző szakterületek és a szorongás**

Dr. Mór E. Csaba
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

12.00–12.30 **Vigyázz, kész, fájt! – A fájdalom a múlté. Korszerű fájdalomcsillapítási lehetőségek**

Dr. Szántó Sándor, egyetemi docens
DE KK Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék, Sportorvosi Tanszék

12.30–13.00 **Több mint generikum, szupergenerikum**

Krka orvoslátogatója

13.00 **Ebéd**

Akkreditáció

A rendezvény **utóakkreditálásra** kerül. Várható pontértéke: **12 pont**.

MINDEN ÚJ LAP egy új lehetőség



A szinergia ereje

RAVALSYO® rosuvastatin és valsartan

Ravalsyo 10 mg/80 mg, 20 mg/80 mg, 10 mg/160 mg, 20 mg/160 mg filmtabletta: 10 mg rosvasztatint (rosvasztatin-kalcium formájában) és 80 mg valsartánt (rosvasztatin-kalcium formájában) és 80 mg valsartánt, 10 mg rosvasztatint (rosvasztatin-kalcium formájában) és 160 mg valsartánt, 20 mg rosvasztatint (rosvasztatin-kalcium formájában) és 160 mg valsartánt tartalmazó filmtabletták.

Javallatok: A Ravalsyo azon felnőtt betegek számára javallott szubtitulációs kezelésként, akiknek egyidejűleg magas vérnyomás kezelésére adott, ugyanolyan dózisú rosvasztatin és valsartán monokomponensű készítménnyel kontrollálható a betegsége, mint a f. kombináció dózisa, és ha feltételezhetően magas az első szív-érrendszeri szövődmény bekövetkezésének kockázata (súlyos cardiovascularis szövődmény megelőzése céljából), vagy ha az alábbi körülmények valamelyike szint fennáll: primer hypercholesterinaemia (IIa típus), ideértve a heterozigóta familiális hypercholesterinaemiát is), vagy kevert dyslipidaemia (IIb típus), homozigóta familiális hypercholesterinaemia. **Adagolás:** A terápia megkezdése előtt a betegnek szteroid koleszterinszintet csökkentő diétára kell állítani, melyre a gyógyszeres kezelés ideje alatt is folytatni kell. A Ravalsyo ajánlott adagja egy tablettát naponta. A f. dózis kombináció nem alkalmas kezdeti terápia. A Ravalsyo-ra történő áttérés előtt a betegeket az azonos időben bevett egyes összetevők stabil dózisaira kell beállítani. A Ravalsyo dózisát az alábbi időpontokban külön-külön szedett egyedi hatóanyagok dózisa alapján kell megállapítani. Amennyiben bármilyen okból (pl. újjan diagnosztizált társuló betegség, a beteg állapotának megváltozása vagy gyógyszerinterakció stb.) valamelyik hatóanyag adagjának a módosítása indokoltul válik, az adagok tömörített titrálása érdekében a betegeket vissza kell állítani a külön szedett összetevőkre. Súlyos vesekárosodásban a Ravalsyo alkalmazása minden dózisra vonatkozóan ellenjavallt. Nem szükséges a dózis módosítása azoknál a felnőtt betegeknél, akik kreatinin clearance-e > 10 ml/perc (lásd 4.4 és 5.2 pont). Vesekárosodás esetén a valsartán és az aliszirén együttes alkalmazása ellenjavallt (GFR < 60 ml/perc/1,73 m²). **Májkörosodásban szenvedő betegek:** A rosvasztatin szisztémás expozícióját szintje 7 és annál kisebb Child-Pugh érték esetén nem növekedett. Azonban a szisztémás expozíció emelkedését figyeltek meg 8 és 9 Child-Pugh érték mellett. Ezeknél a betegeknél a májfunkció ellenőrzését ajánljuk. Nincs tapasztalat 9-nél nagyobb Child-Pugh értékeknél. **Actív májbetegség esetén,** súlyos májkörosodásban, bilirubin emelkedésben, valamint cholestasissal járó szindrómákban a Ravalsyo ellenjavallt. A cholestasissal nem járó enyhe vagy közepesen súlyos májkörosodásban szenvedő betegeknél a valsartán dózis nem haladhatja meg a 80 mg-ot. **Egyidejű terápia:** A rosvasztatin különböző transzportfehérék szubstrája (például OATP1B1 és BCRP). A miyopathia (beleértve a rhabdomiolysist is) kockázata fokozódik, amikor a rosvasztatint egyidejűleg alkalmazzuk bizonyos olyan gyógyszerekkel, amelyek megnövelhetik a rosvasztatin plazmakoncentrációját az ezekkel a transzportfehérékkel történő interakció következtében (például ciklosporin és bizonyos proteáz inhibitorok, beleértve a ritonavir kombinációját azaanavirrel, lopinavirrel és vagy tipranavirrel). Amikor lehetséges, alternatív gyógyszeres kezelést kell megfontolni, és ha szükséges, mérleget kell a rosvasztatin terápia átmeneti felfüggesztéséről. Azonban az esetekben, amikor ezeknek a gyógyszereknek az együttes alkalmazása elkerülhetetlen, az egyidejű kezelésnek és a rosvasztatin-adagolás módosításának előnyét és kockázatát kell gondosan mérlegelni. **Gyermekek és serdülők:** A Ravalsyo biztonságosságát és hatékonyságát 18 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nem igazolták. A Ravalsyo alkalmazása nem javasolt 18 évesnél fiatalabb betegeknél. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagai vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagukal szembeni túlérzékenységi Actív májbetegségben szenvedő betegeknél, beleértve az ismeretlen eredetű, tartós szúrás transzaminázszint emelkedését, valamint bármilyen szúrás transzaminázszint emelkedést, amelyben az a normál érték feletti határának (ULN, Upper limit of Normal) háromszorosát meghaladja. Súlyos vesekárosodás (kreatinin-clearance < 30 ml/perc). Miopathia. Egyidejű ciklosporin-kezelés. Terhesség és szoptatás ideje alatt, illetve, ha a terhítés korában lévő nő nem védekezik megfelelő fogamzásgátló módszerrel. Súlyos májka-

rosodás, bilirubin emelkedés és cholestasis. A valsartán egyidejű alkalmazása aliszirén tartalmú készítményekkel ellenjavallt diabetes mellitusban szenvedő vagy károsodott veseműködésű betegeknél (GFR < 60 ml/perc/1,73 m²). A Ravalsyo a terhesség és a szoptatás ideje alatt ellenjavallt. **Mellékhatások:** A rosvasztatin alkalmazásakor tapasztalt mellékhatások rendszerint enyhék és átmenetiek. Ellenőrzött klinikai vizsgálatokban, a rosvasztatinnal kezelt betegek közül mellékhatások miatt a betegek kevesebb, mint 4%-át kellett kivonni a vizsgálatokból. A hypertoniában szenvedő felnőtt betegek körében végzett kontrollált klinikai vizsgálatokban a mellékhatások összesített incidenciája megegyezett a placeboval kezelt betegeknél, és összhangban van a valsartán farmakológiai tulajdonságaival. Egyik mellékhatás incidenciája sem mutatott összefüggést a dózissal vagy a kezelés időtartamával, illetve a nemmel, korral vagy rasszal sem. Diabetes mellitus, szédülés, fejfájás, hányinger, hasi fájdalom, Székrekedés, Myalgia, Asthenia. Egyéb HMG-CoA-reduktáz inhibitorokhoz hasonlóan, a nemkívánatos mellékhatások incidenciája dózistól függő tendenciát mutat. **Megjegyzés:** ☐ (egy kereszt). **Összefoglalás: II. csoport.** Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). **Forg. eng. tul.:** KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia. **Alk. érv.:** 2016. október 12.

Készítmény megnevezése	Bruttó fogyszói ár (Ft)	Normatív támogatási összeg (Ft)	Térítési díj nor- matív támogatás esetén (Ft)	Közzegyen kiváltható-e
Ravalsyo 10 mg/80 mg filmtabletta 30x	1 797	988	809	✓
Ravalsyo 10 mg/160 mg filmtabletta 30x	1 958	1 077	881	✓
Ravalsyo 20 mg/80 mg filmtabletta 30x	2 928	1 610	1 318	✓
Ravalsyo 20 mg/160 mg filmtabletta 30x	3 171	1 744	1 427	✓

Az árak 2018. augusztus 1-jétől érvényesek.

A mindenkoros árakról bővebb információt a NEAK honlapon – <http://neak.gov.hu/> – találhat.

A tájékoztató kizárólag gyógyszerek rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakkepesítéssel rendelkezők számára készült.

A hatályos alkalmazási előírásokat a <https://www.nygyei.gov.hu/gyogyszeradatsz/> webcímen tudja elérni. Az adott gyógyszer alkalmazási előírását a „Gyógyszer nevének” rész kitöltésével és „keresés indítása” parancssal tudja elindítani. A keresés eredményénél a ikonra kattintva tudja elérni az adott alkalmazási előírást.



Fejlesztés és tudás a kiváló
minőségű, hatásos és
biztonságos termékekért.

Tervezett program

Szeged | 2018. október 06.

Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadók személyében történő változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen az első 100 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

Helyszín: Szeged, Novotel Szeged

6721 Szeged, Maros u. 1.

www.accorhotels.com/gb/hotel-2996-novotel-seged/index.shtml

Üléselnökök:

Prof. Dr. Hógye Márta

SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

Prof. Dr. Ábrahám György, egyetemi tanár

SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika



- 09.00–09.30 **Se veled, se nélküled... esomeprazol**
Dr. Rosztóczy András Ph.D, egyetemi docens
SZTE I. Belgyógyászati Klinika
- 09.30–10.00 **Protokoll vagy szokások a felső légúti infekciókban**
Dr. Bella Zsolt Ph.D
Szeged, FOG Klinika
- 10.00–10.30 **Ivabradinnal a kontroll a te kezében van**
Dr. Piry Katalin
SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika
- 10.30–11.00 **Szünet**
- 11.00–11.30 **Kettős gátlás jelentősége a lipid célértékek eléréséhez**
Dr. Szepesvári Szabolcs
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgató főorvosa
- 11.30–12.00 **Száll a kakukk fészkére - Közérthetően az AT1-receptor blokkolásról**
Prof. Dr. Ábrahám György, egyetemi tanár
SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika
- 12.00–12.30 **Egységben az erő vagy az igazság tényleg odaát van??**
Dr. Szabó István
Bács-Kiskun Megyei Kórház SBO osztályvezető főorvosa
- 12.30–13.00 **Több mint generikum, szupergenerikum**
Nagy Anikó, Krka orvoslátogatója
- 13.00 **Ebéd**

Akkreditáció

A rendezvény **utóakkreditálásra** kerül. Várható pontértéke: **12 pont**.



A Roxera hatékonyságát a Rosu-path, saját klinikai vizsgálat is bizonyítja.⁽²⁾

[illegible]

30x kiszerelés árai	Bruttó fogászati ár (Ft)	Normatív támogatás összeg (Ft)	Teljes (a normatív támogatást ezentén (Ft))	Kiszághoz használható-e
ROXERA 5 mg filmtabletta 30x	616	141	475	✓
ROXERA 10 mg filmtabletta 30x	1 169	854	315	✓
ROXERA 15 mg filmtabletta 30x	1 896	1 345	551	✓
ROXERA 20 mg filmtabletta 30x	2 249	1 793	456	✓
ROXERA 30 mg filmtabletta 30x	3 420	2 690	730	✓
ROXERA 40 mg filmtabletta 30x	3 946	2 861	1 085	✓

90x kiszerelés árai	Bruttó fogászati ár (Ft)	Normatív támogatás összeg (Ft)	Teljes (a normatív támogatást ezentén (Ft))	Kiszághoz használható-e
ROXERA 10 mg filmtabletta 90x	2 638	2 110	528	✓
ROXERA 15 mg filmtabletta 90x	4 996	3 997	999	✓
ROXERA 20 mg filmtabletta 90x	4 996	3 997	999	✓
ROXERA 30 mg filmtabletta 90x	7 182	5 746	1 436	✓

A tájékoztató kizárólag gyógyszerek rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára készült.

A hatályos alkalmazási előírásokat a <https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/> webcímen tudja elérni. Az adott gyógyszer alkalmazási előírását a „Gyógyszer nevének” rész kitöltésével és „keresés indítása” paranccsal tudja elindítani. A keresés eredményénél a ikonra, majd pedig a ikonra kattintva tudja elérni az adott alkalmazási előírást.

¹ Roxera aalkalmazási előírat, www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/

² ESC: ESC Congress 2016, Poster session 2: Cardiovascular prevention outcomes I, Presentation list [Internet]. Sophia Antipolis: European Society of Cardiology; 2016 [cited: 14.7.2016]. <http://www.escardio.org/>



*Fejlesztés és tudás a kiváló
minőségű, hatásos és
biztonságos termékekért.*

Tervezett program

Győr | 2018. október 27.

Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadók személyében történő változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen az első 100 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

Helyszín: Győr, Famulus Hotel

9027 Győr, Budai út 4.,

www.famulushotel.hu

Üléselnökök:

Prof. Dr. Járai Zoltán, c. egyetemi tanár, osztályvezető főorvos
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Prof. Dr. Császár Albert, az MTA doktora, egyetemi tanár,
osztályvezető főorvos;

MH EK Honvédkórház, II. sz Belgyógyászati Osztály



09.00–09.30 **Antibiotikum vs. gyógyfűvek**

Dr. Elek Csaba, háziorvos

09.30–10.00 **Fiatalon az élvezet hiánya fájdalom; öregen a fájdalom hiánya élvezet.”- hatékony és biztonságos fájdalomcsillapítás az élet élvezetéért...**

Dr. Tuczai Alexandra, szakorvos

Magyar Imre Kórház, Ajka

10.00–10.30 **A pszichoszociális rehabilitáció céljai, módszerei, eredményei**

Prof. Dr. Ostorharics-Horváth György PhD.

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház I. Pszichiátriai Osztály

10.30–11.00 **Szünet**

11.00–11.30 **Bázis terápiaán túli kezelési lehetőségek “stabil” szívelégtelenségben**

Dr. Faluközy József, osztályvezető főorvos

Állami Szívkórház, Kardiológiai Osztály, Coronaria őrző, Intenzív betegellátó részleg

11.30–12.00 **Kombináljunk együtt- rosuvastatin és ezetimib gyakorlati alkalmazása**

Prof. Dr. Császár Albert

MH EK Honvédkórház, II. sz Belgyógyászati Osztály

12.00–12.30 **Kombinációs terápiaák a szív- és érrendszeri védelem szolgáltatában**

Prof. Dr. Járai Zoltán, c. egyetemi tanár, osztályvezető főorvos

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

12.30–13.00 **Több mint generikum, szupergenerikum**

Maklári Petra, Krka orvoslátogatója

13.00 **Ebéd**

Akkreditáció

A rendezvény **utóakkreditálásra** kerül. **Várható pontértéke: 12 pont.**



Egyszerűen összetett!

Tamloset®

telmisartan és amlodipin

Tamloset 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg, 80 mg/5 mg, 80 mg/10 mg tabletta, 40 mg telmizartán és 5 mg amlodipint (amlodipin-bezilát formájában), 40 mg telmizartán és 10 mg amlodipint (amlodipin-bezilát formájában), 80 mg telmizartán és 5 mg amlodipint (amlodipin-bezilát formájában), 80 mg telmizartán és 10 mg amlodipint (amlodipin-bezilát formájában) tartalmaz tablettánként. Javallatok: A Tamloset szubsztitúciós terápiaként javasolt essentialis hypertonia kezelésére – azonos dózisszinten, egyidejűleg adott telmizartánnal és amlodipinnel már megfelelően beállított betegek számára. Adagolás: A gyógyszer javasolt adagja naponta egy tabletta. A fix dózisú kombináció nem használható kezdő terápiaként. Akkor lehet áttérni a Tamlosetre, ha a beteg már be van állítva az azonos időben bevett telmizartán és amlodipin stabil dózisaira. A telmizartánnak és az amlodipinnak a gyógyszeradagolási előírások szerint egyedileg megállapított adagjai határozzák meg a Tamloset dózisát. Súlyos vesekárosodásban szenvedő vagy hemodializált betegekkel kapcsolatban korlátozott tapasztalat áll rendelkezésre. A Tamloset súlyos májkárosodásban ellenjavallt. Enyhe és közepesen súlyos májkárosodásban szenvedő betegeknél a Tamloset csak óvatosan adható. Ezeknél a betegeknél a telmizartán adagja a napi egyszeri 40 mg-ot nem haladhatja meg. Az alkalmazás módja: Száján át történő alkalmazásra. A Tamloset táplálékkal vagy anélkül is bevehető. A Tamloset bevétele egy kevés folyadékkal javasolt. Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagaival, dihidropiridin-származékokkal vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. A terhesség második és harmadik trimesztere. Az epeutak obstruktív betegségei. Súlyos májműködési zavar. Súlyos hypotonia. Shock (beleértve a cardiogen shockot is). A balkamrai kiáramlási pálya szűkülete (pl. magasfokú aorta stenosis). Myocardialis infarctus után kialakult haemodinamikailag instabil szívelégtelenség. A telmizartán/amlodipin egyidejű alkalmazása aliszikrén tartalmú készítményekkel ellenjavallt diabetes mellitusban szenvedő vagy károsodott veseműködésű

betegeknél (GFR < 60 ml/perc/1,73 m²). Mellékhatások: leggyakrabban jelentett mellékhatások az aluszékonyág, szédülés, fejfájás, palpitatio, arcpiroulás, hasi fájdalom, hányinger, bokaduzzanat, oedema és fáradékonyág voltak. Megjegyzés: * (egyke-reszes). Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). Forg. eng. jog: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarjenska cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia. Alk. érv: 2017. 02. 20.

Készítmény megnevezése	Bruttó fogyasztói ár (Ft)	Normatív támogatási összeg (Ft)	Véltéti díj normatív támogatás esetén (Ft)	Központyon kiváltható-e
TAMLOSET 40 mg/5 mg tabletta 28x	2 097	1 153	994	✓
TAMLOSET 40 mg/10 mg tabletta 28x	2 260	1 243	1 017	✓
TAMLOSET 80 mg/5 mg tabletta 28x	2 438	1 325	1 113	✓
TAMLOSET 80 mg/10 mg tabletta 28x	2 619	1 440	1 179	✓

Az árak 2018. augusztus 1-jétől érvényesek. A mindenkorú árakról bővebb információt a NEAK honlapján – <http://neak.gov.hu/> – találhat.

A tájékoztató kizárólag gyógyszerek rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára készült.

A hatályos alkalmazási előírásokat a <https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/> webcímen tudja elérni. Az adott gyógyszer alkalmazási előírását a „Gyógyszer nevének” rész kitöltésével és „keresés indítása” parancssal tudja elindítani. A keresés eredményénél a ikonra, majd pedig a ikonra kattintva tudja elérni az adott alkalmazási előírást.



Fejlesztés és tudás a kiváló minőségű, hatásos és biztonságos termékekért.

Tervezett program

Budapest | 2018. október 27.

Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadók személyében történő változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen az első 300 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

Helyszín: Budapest, Raddison Blu Béke

1067 Budapest, Teréz krt. 43.,

www.radissonblu.com

Üléselnök:

Prof. Dr. Tulassay Zsolt, egyetemi tanár

SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika

09:00–09:45 **Harc a túlélésért – sürgősségi ellátás 2018.**

Dr. Zacher Gábor

MH EK Honvédkórház

09:45–10:30 **Sárkány ellen sárkányfű**

Dr. Lakatos László

Forum Humanum Pszichiátriai Magánrendelés Székesfehérvár és Budapest

10:30–11:15 **Egységben az erő - A multimodális fájdalomcsillapítás lehetőségei**

Dr. Budai Erika

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Fájdalomambulancia vezetője

11:15–11:30 **Kávészünet**

11:30–12:15 **Kettős hatalom a rizikók fölött-valsartan, rozuvastatin**

Dr. Tóth Károly PhD, főorvos

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, I. Belgyógyászati osztály

12:15–13:00 **Családi vérnyomáscsökkentés**

Dr. Lippai József

13:00–13:45 **Adni, vagy hozzá adni – ez itt a kérdés?**

Prof. Dr. Karádi István, klinika igazgató egyetemi tanár, az MTA Doktora

SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika

13:45–14:15 **Több mint generikum, szupergenerikum**

Krka orvoslátogatója

14:15 **Ebéd**



Akkreditáció

A rendezvény **utóakkreditálásra** kerül. Várható pontértéke: **12 pont**.

telmisartan
40 mg, 80 mg tabletti

telmisartan és hidroklorotiazid
40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg tabletta



JÓ HÍR MINDEN NAPRA

Az anyag lezárásának dátuma: 2018. augusztus 2. - Hungary.Tolura/Tolucrombi ad148x210 201808

[illegible]

Készletben megnevezése	Bentli fogyasztás je (F)	Normatív támogatási összeg (F)	Térbeli díj normatív támogatás esetén (F)	Kiszághog támogatás-e
Tolura 40 mg tabletta 30x	2 016	1 033	983	✓
Tolura 80 mg tabletta 30x	2 368	1 200	1 168	✓
Tolucombi 40 mg / 12,5 mg tabletta 30x	1 717	631	1 086	—
Tolucombi 80 mg / 12,5 mg tabletta 30x	1 888	989	899	✓
Tolucombi 40 mg / 25 mg tabletta 30x	1 888	989	899	✓

Az árak 2018. augusztus 1-jétől érvényesek

A mindenkori árakról bővebb információt a NEAK honlapján – <http://neak.gov.hu/> – találhat.

A tájékoztató kizárólag gyógyszerek rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára készült.

A hatályos alkalmazási előírásokat a <https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/> webcímen tudja elérni. Az adott gyógyszer alkalmazási előírását a „Gyógyszer nevének” rész kitöltésével és „keresés indítása” parancssal tudja elindítani. A keresés eredményénél a  ikonra, majd pedig a  ikonra kattintva tudja elérni az adott alkalmazási előírást.

*Fejlesztés és tudás a kiváló
minőségű, hatásos és
biztonságos termékekért.*

The image features a repeating pattern of light gray hexagons on a white background. Overlaid on this pattern are horizontal dotted lines, which are evenly spaced and span the width of the image. The hexagons are arranged in a standard honeycomb lattice, and the dotted lines intersect them, creating a grid-like structure within the hexagonal cells.

The image features a repeating pattern of light gray hexagons, similar to a honeycomb structure, overlaid with horizontal dotted lines. The hexagons are arranged in a staggered grid, and the dotted lines run horizontally across the entire image, creating a guide for writing.

The image features a repeating pattern of light gray hexagons on a white background. Overlaid on this pattern are horizontal dotted lines, which are evenly spaced and span the width of the image. The hexagons are arranged in a standard honeycomb lattice, and the dotted lines intersect them, creating a grid-like structure within the hexagonal cells.

Perindopril Família Krka



DALNESSA®

perindopril és amlodipin
4 mg / 5 mg, 4 mg / 10 mg, 8 mg / 5 mg,
8 mg / 10 mg tabletta

CO-DALNESSA®

perindopril, amlodipin és indapamid
4 mg/5 mg/1,25 mg, 4 mg/10 mg/1,25 mg,
8 mg/5 mg/2,5 mg, 8 mg/10 mg/2,5 mg tabletta

Egyszerűen célértéken

Készítmény megnevezése	Bruttó fogyasztói ár (Ft)	Normatív támogatási összeg (Ft)	Térítési díj normatív támogatás esetén (Ft)	Közfgyógyon kiváltható-e
Dalnessa 4 mg/5 mg tabletta 30x	1 099	634	465	✓
Dalnessa 8 mg/5 mg tabletta 30x	1 668	1 011	657	✓
Dalnessa 4 mg/10 mg tabletta 30x	1 371	806	565	✓
Dalnessa 8 mg/10 mg tabletta 30x	2 143	1 183	960	✓
Co-Dalnessa 4 mg/5 mg/1,25 mg tabletta 30x	1 624	898	726	✓
Co-Dalnessa 4 mg/10 mg/1,25 mg tabletta 30x	1 725	1 070	655	✓
Co-Dalnessa 8 mg/5 mg/2,5 mg tabletta 30x	2 646	1 539	1 107	✓
Co-Dalnessa 8 mg/10 mg/2,5 mg tabletta 30x	2 961	1 711	1 250	✓

Az árak 2018. augusztus 1-jétől érvényesek. A mindenkorú árakról bővebb információt a NEAK honlapján – <http://neak.gov.hu/> – találhat.

A tájékoztató kizárólag gyógyszerek rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára készült.

A hatályos alkalmazási előírásokat a <https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/> webcimen tudja elérni. Az adott gyógyszer alkalmazási előírását a „Gyógyszer nevének” rész kitöltésével és „keresés indítása” paranccsal tudja elindítani. A keresés eredményénél a 🔍 ikonra, majd pedig a 📄 ikonra kattintva tudja elérni az adott alkalmazási előírást.



Fejlesztés és tudás a kiváló
minőségű, hatásos és
biztonságos termékekért.

Technikai szervező

Szervezési információk:

Horvát Renáta

E-mail: rhorvat@convention.hu

Regisztráció:

Szaniszló Kata

E-mail: szaniszló@convention.hu

Convention Budapest Kft.

H-1143 Budapest, Besnyői utca 13., 1. emelet

Telefon: +36 1 299 0184, -85, 86;

Fax: +36 1 299 0187

www.convention.hu

Online regisztráció
a roadshow megfelelő állomásán:

www.convention.hu